

УДК:598.241.2(571.65)

ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТЕРХА (*GRUS LEUCOGERANUS*) В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Слепцов Ю. А.

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан

E-mail: slep-u@yandex.ru

Документально зарегистрирован первый случай встречи стерха в Магаданской области. Выполнены наблюдения за одиночной птицей вне гнездового ареала, в период размножения.

Ключевые слова: стерх, *Grus leucogeranus*, Магаданская область.

DOI: 10.34078/1814-0998-2023-4-110-112

Стерх, или белый журавль *Grus leucogeranus* (Pallas, 1773), имеет разобщенный гнездовой ареал в Западной и Восточной Сибири. Птицы западной популяции обитают в междуречье Оби и Енисея и зимуют в Северной Индии и Иране. С целью сохранения этот журавль занесен в Красный список МСОП как критически угрожаемый вид (BirdLife International, 2018), Красную книгу Российской Федерации (2021), Красную книгу Республики Саха (Якутия) (2019), Красную книгу Хабаровского края (2019).

Стерхи восточной популяции размножаются на Северо-Востоке Якутии и улетают на зимовку в Юго-Восточный Китай на оз. Поянху в долине р. Янцзы. По последним данным, на 2020 г. численность стерха на зимовках в Китае составляет чуть более 5.5 тыс. особей (Цзян и др., 2021). Основной коридор миграции стерха якутской популяции проходит по континентальной части востока Азии (Владимирцева и др., 2016). На Дальнем Востоке России в период миграции птиц регистрировали в бассейне р. Амур и на юге Приморского края. Залеты отмечены на о. Сахалин и п-ов Камчатка (Нечаев, Гамова, 2009). По данным опросов местных жителей Охотского района Хабаровского края, стерх регулярно встречается здесь в период весеннего и осеннего пролетов. Регистрируются как отдельные особи, так и небольшие группы, а 8 октября 1998 г. на р. Охота в 40 км от устья одна птица была добыта из стайки в пять особей. Изготовленное из нее чучело (рис. 1) хранится в краеведческом музее п. Охотск (Пронкевич, Мороков, 2012).

В Магаданской области ранее не имелось сведений о встречах белого журавля. 8 июля 2023 г.



Рис. 1. Чучело стерха в краеведческом музее п. Охотск, 2022 г. Фото автора.

Fig. 1. Stuffed Siberian White Crane in the Okhotsk Settlement Museum, 2022. Photo by the author.

местными рыбаками произведена видеозапись на камеру смартфона в окрестностях с. Балаганное (59° 39' 39" с. ш., 149° 05' 28" в. д., 100 км к западу от Магадана), на которой была запечатлена крупная птица белого цвета. Последующий просмотр и анализ видеозаписи позволил определить птицу как стерха. Позднее, 12 июля нам удалось побывать в этом месте, провести наблюдения за поведением птицы и сделать серию фотоснимков. В течение всего времени наблюдения стерх спокойно кор-

мился, перемещаясь по небольшим водоемам, расположенным вдоль р. Амунка в полукилометре от села, в 50 м от автомобильной трассы. Место нахождения птицы представляло собой увлажненную мохово-осоково-пушицевую равнину с сетью мелких озер и имело сходство с гнездовым биотопом стерха в Якутии (Флинт, 1987). Периодически птица останавливалась и поправляла оперение в районе груди (рис. 2). Журавль был хорошо заметен на фоне низкорослых травянистых зарослей. Окраска всего тела имела однотонный светлый характер, за исключением области в нижней части шеи (рис. 3). Возможно, это пятно возникло в результате окраса оперения окислами железа как элемент брачного поведения (Флинт, 1987). При приближении наблюдателя примерно на 30 м стерх старался уйти. В условиях размножения стерхи покидают гнездо при появлении человека на расстоянии 1.5–2 км и возвращаются при его уходе с территории (Флинт, 1987).

Иногда птица перелетала на небольшие расстояния. На фотографиях, полученных в полете, видны повреждения дистальных частей 7 и 8 первостепенных маховых перьев, а также отсутствие нескольких второстепенных и третьестепенных маховых перьев в левом крыле. Кроме этого на снимке видно, что птица находилась в процессе линьки, о чем свидетельствовали выпадающие перья (рис. 4).

16 июля птица оставалась в том же месте, и Л. А. Зеленская сделала фотоснимки стерха во время кормления, на которых среди добычи хорошо различима трёхиглая колюшка (*Gasterosteus aculeatus*) (рис. 5).

Таким образом, факт появления взрослой птицы в гнездовое время за пределами района размножения и в стороне от основного пролетного пути, а также нехарактерное для вида толерантное отношение к человеку и характер повреждения маховых перьев (по всей видимости – подрезанных, что практикуется чаще все-



Рис. 2. Стерх во время чистки оперения, с. Балаганное, 12.07.2023.

Fig. 2. Siberian White Crane while cleaning its plumage, Settlement of Balagannoye, 12.07.2023.



Рис. 3. Стерх в окрестностях с. Балаганное, 12.07.2023.

Fig. 3. Siberian White Crane in the Balagannoye vicinities, 12.07.2023.



Рис. 4. Стерх в полете, 12.07.2023.

Fig. 4. Siberian White Crane in flight, 12.07.2023.



Рис. 5. Стерх с добычей, 16.07.2023. Фото Л. А. Зеленской.

Fig. 5. Siberian White Crane with its prey, 16.07.2023. Photo by L. A. Zelenskaya.

го при полувольном содержании) предполагают возможность контакта данной птицы с человеком в недалеком прошлом.

Автор благодарит А. А. Знаменского и Л. А. Зеленскую за предоставленную информацию.

ЛИТЕРАТУРА

Владимирцева М. В., Гермогенов Н. И., Бысыкатова И. П., Слепцов С. М. Стерх в Якутии // Наука и техника в Якутии. 2016. № 1 (30). С. 84–89.

Поступила в редакцию 24.07.2023

Поступила после доработки 26.10.2023.

THE FIRST REGISTRATION OF THE SIBERIAN WHITE CRANE (*GRUS LEUCOGERANUS*) IN MAGADAN OBLAST

Yu. A. Sleptsov

Institute of Biological Problems of the North, Magadan

The first case of meeting a Siberian White Crane in Magadan Oblast has been documented. Observations of a single bird were made outside the nesting range, during the breeding season.

Keywords: Siberian White Crane, *Grus leucogeranus*, Magadan Oblast.

REFERENCES

BirdLife International, 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. 2018. *Leucogeranus leucogeranus*. URL: <https://www.iucnredlist.org/species/22692053/98336905> (accessed 06.12.2022).

Flint, V. E., 1987. Siberian Crane *Grus leucogeranus*, *Birds of USSR. Galliformes, Gruiformes*. Leningrad, Nauka, 313–326. [In Russian].

Jiang, H., Liu, W., Wang, Y., 2021. The Updated Population Estimate and Distribution of the Siberian Crane at Migration Stopovers in China, *Cranes of Eurasia: Distribution, Biology*. 6, 320–334 [In Russian].

Nechayev, V. A., Gamova, T. G., 2009. Birds in Russia's Far East (Annotated Catalogue). Vladivostok, Dalnauka [In Russian].

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 2 : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Москва : Наука, 2019. 270 с.

Красная книга Российской Федерации. Том «Животные». Москва : ВНИИ Экология, 2021. 1128 с.

Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных. Воронеж : Мир, 2019. 604 с.

Нечаев В. А., Гамова Т. В. Птицы Дальнего Востока России. Владивосток : Дальнаука, 2009. 564 с.

Пронкевич В. В., Мороков В. Е. Заметки о птицах Охотского района Хабаровского края // Амурский зоологический журнал. 2012. № IV (2). С. 194–196.

Флинт В. Е. Стерх *Grus leucogeranus* // Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные. Ленинград : Наука, 1987. С 313–326.

Цзян Х., Лиу В., Ван Ю. Новые данные по численности и распределению стерха на миграционных останках // Журавли Евразии (распространение, биология). 2021. Вып. 6. С. 320–334.

BirdLife International. The IUCN Red List of Threatened Species. 2018. *Leucogeranus leucogeranus*. URL: <https://www.iucnredlist.org/species/22692053/98336905> (дата обращения 06.12.2022).