

УДК: 598.294.1(571.65)

ОБЫКНОВЕННЫЙ СКВОРЕЦ (*STURNUS VULGARIS*) В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Слепцов Ю. А. 

ФБГУН Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан

E-mail: slep-u@yandex.ru

Обыкновенный скворец (*Sturnus vulgaris*) – немногочисленный гнездящийся вид Магаданской области, который 14 лет назад впервые появился и затем успешно закрепился на ее территории. Обобщены все сведения о встречах данного вида в регионе. Впервые приводятся документальные свидетельства гнездовых находок скворца.

Ключевые слова: скворец, Магаданская область, гнездование.

DOI: 10.34078/1814-0998-2025-3-91-96

ВВЕДЕНИЕ

В Магаданской области существует ряд видов птиц, которые в недавнее время пополнили фаунистический список региона и активно расширяют область своего распространения, изменяя также статус своего пребывания. К таким видам относится обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758. Впервые он был отмечен на юге Магаданской области в 2011 г. (Дорогой, 2011) и некоторое время пребывал в статусе редкого залетного вида. В дальнейшем количество встреч увеличивалось, появились сведения о его находках в континентальных районах области, и в настоящее время скворец отмечается нами практически ежегодно. Однако документальных свидетельств находок гнезд на территории региона, равно как и их описаний, до сих пор не было. Поскольку рост численности и расширение гнездового ареала у обыкновенного скворца происходят и в соседних регионах Дальнего Востока, мы провели обобщение всех известных сведений о пребывании скворца в Магаданской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первый залет скворца на территории Магаданской области зарегистрирован 14 июня 2011 г. в окрестностях поселка Ола (Дорогой, 2011). Повторно вид был встречен в том же районе в апреле, только спустя четыре года (Дорогой, 2015). В 2016 г. впервые были получены свидетельства того, что статус обыкновенного скворца может быть переквалифицирован из залетного в гнездящегося: 14 июня были зарегистриро-

ваны взрослые птицы с кормом, а 21 июня был отмечен выводок из 9 летних птенцов (Дорогой, 2016).

28 мая 2016 г. были отмечены скворцы и в континентальных районах области – в селе Оротук (Синельникова, 2017). При этом автор указывает, что уже «на следующий день число птиц достигло 120–150. В следующие дни часть скворцов приступила к постройке гнезд на верхних этажах заброшенных зданий, под балками, на чердаках. Остальные птицы, вероятнее всего, покинули село... Было найдено 25 гнезд скворцов, остальные кладки были разорены лаской *Mustella nivalis* и горностаем *Mustella erminea*...» (Синельникова, 2017). К сожалению, описаний гнезд, мест их расположения, конкретного результата размножения птиц автор не приводит.

В дальнейшем встречи скворцов становятся практически ежегодными, при этом во всех случаях отмечаются отдельные птицы или пары. Так, одиночную молодую птицу в гнездовом наряде в течение двух дней 10 и 11 июля 2019 г. на приморской террасе острова Талан наблюдала Е. Ю. Голубова (устное сообщение).

Пара скворцов была сфотографирована в пос. Ола орнитологом-любителем Н. А. Петруниной 8 июня 2020 г. и 15 мая 2021 г. Информация об этом размещена на сайте «Птицы Дальнего Востока» (<https://fareast.russia.birding.day/v2photo.php?l=ru&s=009200045&n=1&si=fer>).

26 апреля 2021 г. две птицы встречены автором на окраине Магадана, на левом берегу р. Магаданка в нижнем ее течении в зарослях ивняка.

Две пары скворцов, собиравших корм на придорожных лугах пос. Армань, были отмечены 3 июня 2021 г. (А. В. Кондратьев, устное сообщение и фото).

В первой декаде июня 2021 г. взрослую птицу наблюдали в тот момент, когда она залетала с кормом в клюве в разбитое окно одного из складских строений на окраине Магадана (А. В. Кондратьев, устное сообщение).

11 сентября 2021 г. группа из 5 птиц была встречена в пос. Ола (В. В. Данилова устное сообщение и фото).

В 2023 г. одиночный скворец был зарегистрирован в нижнем течении р. Магаданка в конце апреля (П. Х. Балько, устное сообщение и фото).

В середине мая 2023 г. одиночного скворца наблюдали на полигоне ТКО пос. Омсукчан (О. Н. Вохмина, устное сообщение и фото).

Таким образом, на территории области скворец был встречен как на побережье Охотского моря (остров Талан, пос. Армань, Ола, г. Магадан), так и в континентальных районах (с. Оротук, пос. Омсукчан) (рис. 1). Прилет птиц на места гнездования происходит в конце апреля. В численном отношении единовременные наблюдения скворцов не превышают десятка особей. Приводимые сведения для пос. Оротук в 150 особей (Синельникова, 2017) сопоставимы толь-

ко с цифрами для юга Верхнего Приамурья, где за 40 последних лет сформировался миграционный коридор этих птиц (Дугинцов, 2014). До настоящего времени скворец в регионе считался гнездящимся видом (токование, наблюдение птиц в гнездовой сезон, встреча взрослых птиц с кормом и лётных молодых), однако никаких описаний гнезд не было.

Впервые материалы, описывающие успешное размножение скворцов в Магаданской области, были получены в 2024 г. автором. 9 мая 2024 г. в пос. Сеймчан встречена пара скворцов, а позднее найдено место гнездования.

Самец в утренние часы находился поблизости от гнезда и активно пел. В песне различалось подражание голосам обыкновенной пустельги (*Falco tinnunculus*), зимняка (*Buteo lagopus*), перевозчика (*Actitis hypoleucos*), большого улиты (*Tringa nebularia*) и сороки (*Pica pica*). Самка находилась непосредственно на гнезде, которое располагалось внутри водоотводного желоба на крыше двухэтажного административного здания (рис. 2). Позднее самка слетала с гнезда, и они вместе с самцом улетали кормиться. Гнездо-




Рис. 1. Районы регистрации обыкновенного скворца в Магаданской области.

Fig. 1. Areas of recording the Common Starling in Magadan Oblast.



Рис. 2. Самка скворца у гнезда 10.05.2024 (слева) и общее его расположение (справа), поселок Сеймчан.

Fig. 2. Female starling at the nest on 10.05.2024 (left) and its general location (right), settlement of Seymchan.

вая постройка из сухой травы находилась на глубине около 2 м от входа, и рассмотреть содержимое кладки не представлялось возможным. По всей видимости, в эти дни шла откладка яиц. К моменту нашего повторного визита в Сеймчан 22 июня птенцы уже покинули гнездовой участок.

В 2025 г. автору удалось найти доступное для осмотра гнездо скворца в заброшенном селе Колымское в 5 км к югу от Сеймчана (рис. 3). 16 мая был замечен самец со строительным материалом, залетающий в отверстие, ведущее в гнездовую камеру. Гнездо располагалось на верхнем этаже 3-этажного нежилого дома в нише кухонного помещения с выходом наружу вентиляционного отверстия. В народе эта ниша имеет название «колымский холодильник», поскольку ранее использовалась для хранения продуктов. Практически вся верхняя полка ниши была выстлана сухой растительностью, размер «подушки» 20 × 35 см, высота 14 см. В подавляющем большинстве в постройке был использован вейник Лангсдорфа (*Calamagrostis langsdorffii*) и в небольшом количестве присутствовали листья конского щавеля (*Rumex confertus*). Во время осмотра самка находилась неподалеку, в гнезде было отложено пер-

вое яйцо. Откладка яиц завершилась 21 мая, полная кладка содержала 6 яиц. Их размеры в мм: 29.3 × 21.0; 29.0 × 21.2; 29.8 × 21.8; 30.0 × 20.9; 30.4 × 21.1; 28.8 × 20.2. Насиживание длилось 11 дней, и 1 июня появились птенцы (рис. 4).

Кроме этого, весной 2025 г. в поселке Сеймчан была зарегистрирована попытка гнездования скворца в жилом доме на высоте пятого этажа, которая была предотвращена местными жителями закрытием вентиляционного отверстия в нише кухонного помещения.

Таким образом, все обнаруженные места гнездования находились в укромных местах и были недоступны для наземных хищников. Выбор скворцами мест гнездования затрудняет их поиск, и не всегда они оказываются доступными для осмотра. Даже в местах массового гнездования скворцов из 30 гнездящихся пар удастся найти всего 6 гнезд (Горошко, 2015). В этом свете упоминание о находке сразу 25 гнезд в течение одного сезона (Синельникова, 2017) вполне закономерно вызвало большой интерес, поскольку такая высокая плотность гнездования скворца на территории Дальнего Востока ранее нигде описана не была. Неудивительно, что данное



Рис. 3. Самка скворца в вентиляционном отверстии 16.05.2025 (слева) и общий план расположения гнезда с полной кладкой 22.05.2025 (справа), село Колымское.

Fig. 3. Female starling in a ventilation hole on 16.05.2025 (left) and the general plan of the nest location with a full clutch on 22.05.2025 (right), Kolymskoye village.



Рис. 4. Гнездо скворца с птенцами 2-дневного возраста 02.06.2025.

Fig. 4. Starling nest with 2-day-old chicks, 02.06.2025.

упоминание о столь высокой гнездовой плотности привело к появлению ссылок на нее в последующих обобщающих работах, описывающих статус обыкновенного скворца в других регионах Дальнего Востока где, к сожалению, появи-

лась ошибка в упоминании населенного пункта (вместо пос. Оротук указан пос. Ола – Глушенко и др., 2021). Как уже говорилось выше, упомянутая публикация о гнездовании скворца в пос. Оротук (Синельникова, 2017) не содержит

никакого сколько-нибудь подробного описания мест расположения гнезд, их точного числа, методов установления факта гнездования и методов определения успеха гнездования. Поэтому использовать какие-либо приводимые сведения для сравнительной оценки нет никакой возможности.

Все эти данные, полученные в течение 14 последних лет, позволяют охарактеризовать статус скворца в Магаданской области как немногочисленного гнездящегося вида. В целом на Дальнем Востоке появление и закрепление вида на территории проходили неравномерно. Так, на острове Сахалин вид впервые был встречен в 1988 г. (Нечаев, 1991), первая находка гнезда произошла в 2014 г. (Вальчук и др., 2014), а в настоящее время скворец расселился практически по всему острову (Глуценко и др., 2021). На Камчатке первый залет отмечен в 2011 г. (Рождественский, Курякова, 2012), а в 2015 г. достоверно зарегистрирован первый случай его гнездования (Курякова, Рождественский, 2015). В 1980-х гг. первые наблюдения скворца отмечены в районе Верхнего (Дугинцов, 2014) и Нижнего (Бабенко, 2000) Приамурья. Гнездовая находка в Хабаровском крае зарегистрирована только в 2018 г. (Пронкевич, 2019). На Курильских островах залет скворца зафиксирован на острове Кунашир в 2014 г. (Аббакумов, 2015). В 2025 г. отмечено его гнездование на острове Итуруп в пос. Рейдово (П. С. Ктиторов, устное сообщение). В то же время в Приморье скворец пока пребывает в статусе редкого залетного вида (Глуценко и др., 2016; 2021). На Западной Чукотке, в пос. Апателгино, 27 июля 2019 г. впервые зарегистрирована встреча скворца (О. Д. Прокопенко, устное сообщение), а 31 июля В. В. Даниловой получены его фотоснимки (личное сообщение). Учитывая такое активное расселение скворца по территориям, логично предположить в будущем его появление в других населенных или заброшенных пунктах Магаданской области.

ЛИТЕРАТУРА

- Аббакумов С. Н. Новые встречи обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на Сахалине и первая встреча этого вида на Кунашире в 2014 году // Русский орнитологический журнал. 2015. Т. 24. Экспр.-вып. 1115. С. 816–818.
- Бабенко В. Г. Птицы Нижнего Приамурья. Москва: Прометей, 2000. 725 с.
- Поступила в редакцию 05.06.2025.
Поступила после доработки 20.06.2025.
- Вальчук О. П., Масловский К. С., Акуликин С. Ф., Атрохова Т. А. Ожидаемая находка первого гнездового поселения обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* Linnaeus в Дальневосточном регионе: пгт Ноглики, северо-восточный Сахалин, лето 2014 // Дальневосточный орнитологический журнал. 2014. № 4. С. 57–62.
- Глуценко Ю. Н., Коробов Д. В., Бурковский О. А., Смекалов Г. Н., Шохрин В. П., Остапенко К. А., Савко Т. Ю. Активное расселение обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* по острову Сахалин // Русский орнитологический журнал. 2021. Т. 30. Экспр.-вып. 2123. С. 4711–4719.
- Глуценко Ю. Н., Нечаев В. А., Редькин Я. А. Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор. Москва: КМК, 2016. 523 с.
- Горошко О. А. Первое массовое гнездование скворцов *Sturnus vulgaris* в Восточном Забайкалье // Байкальский зоологический журнал. 2015. Т. 1 (16). С. 125–126.
- Дорогой И. В. Залеты белокрылой цапли *Ardeola bacchus* и обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на юг Магаданской области // Русский орнитологический журнал. 2011. Т. 20. Экспр.-вып. 663. С. 1139–1142.
- Дорогой И. В. Второй залет обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на южное побережье Магаданской области // Русский орнитологический журнал. 2015. Т. 24. Экспр.-вып. 1211. С. 4020–4022.
- Дорогой И. В. К распространению обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на север // Русский орнитологический журнал. 2016. Т. 25. Экспр.-вып. 1311. С. 2595–2597.
- Дугинцов В. А. О встречах обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на юге Верхнего Приамурья // Дальневосточный орнитологический журнал. 2014. № 4. С. 63–68.
- Курякова О. П., Рождественский О. Ю. Первое наблюдение гнездования обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на Камчатке // Русский орнитологический журнал. 2015. Т. 24. Экспр.-вып. 1204. С. 3784–3786.
- Нечаев В. А. Птицы острова Сахалин. Владивосток: АН СССР, 1991. 748 с.
- Пронкевич В. В. Новые сведения о редких видах птиц Хабаровского края // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2019. № 2. С. 89–98.
- Рождественский О. Ю., Курякова О. П. Регистрация обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* и ходулочника *Himantopus himantopus* на Камчатке // Русский орнитологический журнал. 2012. Т. 21. Экспр.-вып. 805. С. 2542–2544.
- Синельникова Н. В. О распространении обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* на северо-запад Магаданской области // Русский орнитологический журнал. 2017. Т. 26. Экспр.-вып. 1430. С. 1486–1488.

COMMON STARLING (*STURNUS VULGARIS*) IN MAGADAN OBLAST

Yu. A. Sleptsov

Institute of the Biological Problems of the North, FEB RAS, Magadan

The Common Starling (*Sturnus vulgaris*) is a rare breeding species in Magadan Oblast, which first appeared in the territory 14 years ago and then successfully settled in the area. All information about the species records in the territory is summarized. For the first time, documentary evidence of the starling nesting case is provided.

Keywords: Common Starling, Magadan Oblast, nesting.

REFERENCES

- Abbakumov, S. N., 2015. New Records of the Common Starling *Sturnus vulgaris* in Sakhalin and the First Meeting of This Species on Kunashir in 2014, *Russian Journal of Ornithology*. 24 (1115), 816–818 [In Russian].
- Babenko, V. G., 2000. Birds of the Lower Amur Region. Moscow, Prometey [In Russian].
- Dorogoy, I. V., 2016. To the Northward Expansion of the Common Starling *Sturnus vulgaris*, *Russian Journal of Ornithology*. 25 (1311), 2595–2597 [In Russian].
- Dorogoy, I. V., 2015. Second Visitation of the Common Starling *Sturnus vulgaris* on the Coast of the Sea of Okhotsk in the South of Magadan Oblast, *Russian Journal of Ornithology*. 24, 1211, 4020–4022 [In Russian].
- Dorogoy, I. V., 2011. Visitations of the Chinese Pond Heron *Ardeola bacchus* and the European Starling *Sturnus vulgaris* in the South of Magadan Oblast, *Russian Journal of Ornithology*. 20 (663), 1139–1142 [In Russian].
- Dugintsov, V. A., 2014. On the Common Starling *Sturnus vulgaris* Records in the Southern Upper Amur Region, *Far-Eastern Journal of Ornithology*. 4, 63–68 [In Russian].
- Gluschenko, Yu. N., Korobov, D. V., Burkovsky, O. A., Smekalov, G. N., Shokhrin, V. P., Ostapenko, K. A., Savko, T. Yu., 2021. Expansion of the Common Starling *Sturnus vulgaris* across Sakhalin Island, *Russian Journal of Ornithology*. 30 (2123), 4711–4719 [In Russian].
- Gluschenko, Yu. N., Nechaev, V. A., Redkin, Ya. A., 2016. Birds of Primorsky Krai: Brief Review of the Fauna. Moscow, KMK Scientific Press Ltd. [In Russian].
- Goroshko, O. A., 2015. The First Mass Breeding of the Common Starling *Sturnus vulgaris* in Eastern Transbaikalia, *Baikalskij Zoologičeskij Žurnal*. 1 (16), 125–126 [In Russian].
- Kuryakova, O. P., Rozhdestvensky, O. Yu., 2015. The First Observation of the Common Starling *Sturnus vulgaris* Nesting in Kamchatka, *Russian Journal of Ornithology*. 24 (1204), 3784–3786 [In Russian].
- Nechayev, V. A., 1991. Birds of Sakhalin Island. Vladivostok, AS USSR [In Russian].
- Pronkevich, V. V., 2019. New Data on Rare Birds in Khabarovsk Krai, *Bulletin NESC FEB RAS*. 2, 89–98 [In Russian].
- Rozhdestvensky, O. Yu., Kuryakova, O. P., 2012. Records of the Common Starling *Sturnus vulgaris* and the Black-Winged Stilt *Himantopus himantopus* on the Kamchatka Peninsula, *Russian Journal of Ornithology*. 21 (805), 2542–2544 [In Russian].
- Sinelnikova, N. V., 2017. On the Expansion of the Common Starling *Sturnus vulgaris* to the North-West of Magadan Oblast, *Russian Journal of Ornithology*. 26 (1430), 1486–1488 [In Russian].
- Valchuk, O. P., Maslovsky, K. S., Akulinkin, S. F., Atrokhova, T. A., 2014. Expected Find of the First Nested Colony of Common Starling *Sturnus vulgaris* in the Far East Region: Township Nogliki, Northeast Sakhalin, Summer of 2014, *Far-Eastern Journal of Ornithology*. 4, 57–62 [In Russian].